


Lutte contre le Frelon Asiatique : La Méthode en 2 Saisons

Le frelon asiatique (*Vespa velutina*) est une espèce invasive menaçant la biodiversité. Une méthode de lutte structurée, basée sur le cycle de vie du frelon, permet de localiser et de neutraliser les nids de manière efficace tout au long de l'année.


PHASE 1 : NIDS PRIMAIRES (Avril - Juin)



1. Appâtage Stratégique (Fin Avril)
Placer des "abreuvoirs" avec un appât pour attirer et localiser les reines fondatrices.




2. Repérage des Fondatrices
Observer les allers-retours des reines pour estimer la direction et la distance du nid primaire.



3. Destruction Ciblée (Mi-Juin au plus tard)
Une fois localisée, les nids primaires sont signalés pour être détruits avant l'émergence massive d'ouvrières.


PHASE 2 : NIDS SECONDAIRES (Juillet - Automne)



1. Traque Collective (Dès fin Juillet)
Marquer plusieurs frelons sur les abreuvoirs pour suivre leurs vols de manière coordonnée.



2. Calcul de la Distance



3. Triangulation et Localisation
Utiliser des azimuths depuis plusieurs points pour trianguler l'emplacement exact du nid.

! Vous avez trouvé un nid ?



Danger : Ne pas s'approcher !
Restez à distance, marquez la zone et prévenez votre entourage.

Signalez votre découverte
Enregistrez la position GPS et signalez la nid sur www.tralonastratique.ch.